

Test 1**Bearbeitungszeit:** 60 Minuten.**Erlaubte Hilfsmittel:** 4 eigenhändig handgeschriebene Seiten DIN A4.**Bewertung:** Zu bearbeiten sind die **Aufgaben 1–5**. Es wird nur die Angabe von Endergebnissen verlangt. Rechnungen werden nicht gewertet und nicht eingesammelt.**Aufgabe 1 (1 Punkt)** Berechnen Sie den Binomialkoeffizienten

$$\binom{8}{5} =$$

Aufgabe 2 (1 Punkt) Sei

$$f : \mathbf{R}_{>-4} \rightarrow \mathbf{R}_{>0}, \quad x \mapsto f(x) := \frac{1}{(x+4)^2}.$$

Bestimmen Sie die Umkehrfunktion

$$f^{-1} : \mathbf{R}_{>0} \rightarrow \mathbf{R}_{>-4}, \quad x \mapsto f^{-1}(x) =$$

Aufgabe 3 (2 Punkte) Berechnen Sie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n 5^{-n} =$$

Berechnen Sie

$$\sum_{n=0}^2 (-2)^n 5^{-n} =$$

Aufgabe 4 (2 Punkte) Sei

$$f : \left(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right) \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto f(x) := \frac{xe^{2x}}{\cos(x)} + 3$$

Berechnen Sie die erste Ableitung

$$f' : \left(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right) \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto f'(x) =$$

Aufgabe 5 (4 Punkte) Sei

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) := x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 6x + 2.$$

Berechnen Sie

$$f' : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f'(x) =$$

$$f'' : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f''(x) =$$

Welche lokalen Extremstellen hat f ?

Maximalstellen:

Minimalstellen: